



<b>Principio activo</b>	<b>Nombre comercial</b>	<b>Laboratorio</b>	<b>Año aprobación</b>
Alemtuzumab	Lemtrada	Genzyme Therapeutics Ltd	2013
Cladribine	Mavenclad	Merck Serono Europe Limited	2017
Daclizumab	Zinbryta	Biogen Idec Ltd	2016
Dimethyl fumarate	Tecfidera	Biogen Idec Ltd	2014
Fampridine	Fampyra	Biogen Idec Ltd	2011
Fingolimod hydrochloride	Gilenya	Novartis Europharm Ltd	2011
Interferon beta-1a	Avonex	Biogen Idec Ltd	1997
Interferon beta-1a	Rebif	Merck Serono Europe Ltd	1998
Interferon beta-1b	Betaferon	Bayer AG	1995
Interferon beta-1b	Extavia	Novartis Europharm Ltd	2008
Natalizumab	Tysabri	Biogen Idec Limited	2006
Ocrelizumab	Ocrevus	Roche Registration Limited	2018
Peginterferon beta-1a	Plegridy	Biogen Idec Ltd	2014
Teriflunomide	Aubagio	Sanofi-aventis Groupe	2015

<b>Modo de administración</b>	<b>Frecuencia de administración</b>
Intravenoso	Ciclos de 5 o 3 días anuales
Oral	1 vez al día, durante 4-5 días, 2 veces al año
Subcutáneo	1 vez al mes
Oral	2 veces al día
Oral	2 veces al día
Oral	Cada día
Intramuscular	1 vez por semana
Subcutáneo	3 veces por semana
Subcutáneo	Cada 2 días
Subcutáneo	Cada 2 días
Intravenoso	Cada 4 semanas
Intravenoso	1 inyección cada 6 meses tras la 1ª dosis
Subcutáneo	Cada 2 semanas
Oral	1 vez al día